



Behandlingsskjema Piggsvin

Medikament	Dosering	Hyppighet
Panacur (250 mg)	50 mg pr.kilo (Begynnerdose) Etter 3 dager, økes til 75 mg pr.kilo.	Gis i 7 dager, opphold i 14 dager, deretter 7 nye dager. En gang daglig Blandes i AD/morsmelkbl.
Ripercol vet. Granulat	150 mg pr.kg piggsvin	Gis 3 ganger med 1 ukes intervall (fåes kun hos Carina)
Ventoline mixture 0,4 mg/ml 100ml	0,6 mikrogram pr.kilo. Tilsvare 0,015 milliliter pr.kilo.	Gis 5 første dagene av hver 7 dagers Panacur/Ripercolbeh. Blandes i AD/morsmelkbl.
Depo-Medrone (Cortison)	Standard dose 0,1 ml – for voksne 0,05 ml – for baby	Gis subcutant 1 injeksjon første dag av Panacur/Ripercolbeh. (Gis kun 1.gang)
Clamoxyl (amoxycillin) vet tabl. (40mg/250mg) (Tabletten må knuses for å kunne løses opp i vann)	150 mg pr.kilo	Gis 1.gang daglig i 7 dager Blandes i AD/morsmelkbl. Gis parallelt med første panacur/Ripercolbeh.

Obs: Ormekur og antibiotikal bør gis i separate måltider for å forhindre oppkast.

Ved mistanke om lungebetennelse gi Baytril -10mg pr.kilo 1 x dgl-i 7-10 dager.(maks 14)

Ventolin mixtur - 0,015 ml. Pr.kilo 1.gang daglig - i 5 dager (ca 1 dråpe pr.400 gr.piggsvin)
Eventuelt gis også 1 injeksjon kortison. (Se skjema for dose)