



Behandlingskjema Piggsvin

2016

Skjema utarbeidet i samarbeid i med norsk veterinær, basert på
Tiggywinkles – Hedgehog worming regime

Medikament	Dosering	Hyppighet
Panacur* (250 mg)	100 mg pr. kilo (Begynnerdose) Etter 3 dager, økes til 125 mg pr.kilo. Blandes i AD/morsmelkbl. og gis i sprøyte	Gis i 7 dager, opphold i 14 dager, deretter 5 nye dager. En gang daglig
Droncit (50mg)	20 mg pr.kilo Blandes i AD/morsmelkbl. og gis i sprøyte	Gis(ved behov) første gang 7 dager etter første Panacur* beh., gjentas ved behov etter 14 dgr.
Ventoline mikstur 0,4 mg/ml 100ml	0,015 ml/pr.kg 0-200 gr.piggsvin = ½ dråpe 200-400 gr.pigg = 1 dråpe 400+ gr. = Økes tilsvarende	Gis 5 første dagene av hver ormekurbehandling. Blandes i ormekur.
Depo-Medrone (Kortison)	Standard dose 0,1 ml – for voksne 0,05 ml – for baby	Gis hos veterinær eller oss 1 injeksjon første dag av ormekur/ antibiotikabehandling. (Gis kun 1.gang)
Clamoxyl (amoxycillin) vet tabl. (40mg/250mg) (Tabletten må knuses for å kunne løses opp i vann)	100 mg pr. kilo Blandes i AD/morsmelkbl. og gis i sprøyte	Gis 1.gang daglig i 7 dager Gis parallelt med første ormekurbehandling
Bisolvon** 1,6 mg/ml mikstur	0,2 ml pr.kg	Gis gjennom hele ormekurbehandlingen.
Pro-Soluble (Probiotika) Pulver	Se boks for dosering. Drysses over tørrfor	Gis hele tiden.

Obs: Ormekur og antibiotika bør gis i separate måltider for å forhindre oppkast.

Ved mistanke om lungebetennelse gi Baytril -15mg pr. kilo 2xdgl.-i 7-10 dager.(maks 14)

Ventolin mikstur - 0,015 ml. Pr. kilo 1.gang daglig - i 5 dager (dosering, se skjema)

Eventuelt gis også 1 injeksjon kortison. (Se skjema for dose)

*Vi anbefaler alle som har mulighet, til å begynne med Levamisole injeksjoner som gjøres hos oss. Dette da Panacur ikke er særlig effektiv mot lungeorm som 95% av alle høstpiggsvin har. Levamisole gis som 4 injeksjoner med en ukes mellomrom (Pris 75,- pr.injeksjon)

**Vær obs på at Bisolvon og AD ofte gir løs avføring/diare.