



Behandlingskjema Piggsvin

Skjema utarbeidet i samarbeid med norsk veterinær, basert på
Tiggywinkles – Hedgehog worming regime

Medikament	Dosering	Hyppighet
Vermox (100mg)	100 mg pr.kilo Blandes i AD og gis i sprøyte	Gis 1 x daglig i 7 dager, opphold i 10 dager og gjenta i 7 dager.
Panacur (250 mg)	100 mg pr. kilo Blandes i AD og gis i sprøyte	Gis 1 x daglig i 5 dager, Gis f.o.m dag 3 av 10 dagers oppholdet for Vermox
Droncit (50mg)	20 mg pr.kilo Blandes i AD og gis i sprøyte	Gis ved leverorm (Fluke). Symptomer: Blodig diare, dårlig appetitt, hyperaktivitet. Vektnedgang.
Bisolvon** 1,6 mg/ml mikstur	0,2 ml pr.kg Blandes i AD og gis i sprøyte	Gis gjennom hele Vermox og Panacur behandlingen.
Depo-Medrone (Kortison) Gis hos veterinær hvis piggsvinet er svært tungpustet.	Standard dose 0,1 ml – for voksne 0,05 ml – for baby	Skal kun gis sammen med antibiotikabehandling. Gis kun en gang.
Synulox 40mg eller Clamoxyl 200 mg	100 mg pr. kilo Blandes i AD og gis i sprøyte	Gis 1.gang daglig i 7 dager Gis parallelt med første 7 dagers Vermoxbehandling.
Pro-Soluble (Probiotika) Pulver	1 knivsodd – Gis sammen med ormekur i sprøyte og drysses over tørrfor	Gis hele tiden.

Obs: Ormekur og antibiotika bør gis i separate måltider for å forhindre oppkast.

Ved mistanke om lungebetennelse gi Baytril -15mg pr. kilo 2xdgl.-i 7-10 dager.(maks 14)
Gi Bisolvon og 1 injeksjon kortison hvis ikke gitt før. (Se skjema for dose)

Vi anbefaler alle å også lese gjennom: <https://www.britishhedgehogs.org.uk/leaflets/L8-Care-and-Treatment.pdf>.

De fleste piggsvin kan reddes og rehabiliteres hvis det gjøres riktig.